

防除計画表（記入例）

生産者名：_____ 作物・作型：_____ 年度：_____ もとにした防除暦：_____

時期（月・旬）	生育段階	対象病害虫	予定薬剤	系統コード（FRAC/IRAC）	希釈倍数・量	使用回数（予定・自動）	上限回数（ラベル）	同じ系統の回数（自動）	収穫前日数	実施日	備考（変更の理由など）
5月上旬	定植2週後	灰色かび病	〇〇水和剤	FRAC M5	2,000倍・150L	1	4	1	前日まで	5/8	雨で2日延期
5月中旬	第2花房開花	アブラムシ類	△△乳剤	IRAC 4A	1,000倍・150L	1	2	1	7日前まで	5/18	
5月下旬	第3花房開花	灰色かび病	□□フロアブル	FRAC 7	2,000倍・150L	1	3	1	前日まで	5/27	前回と別系統を選ぶ
6月上旬	収穫始め	コナジラミ類	◇◇水溶剤	IRAC 28	2,000倍・150L	1	2	1	前日まで		発生を見て判断
6月中旬	収穫期	灰色かび病	〇〇水和剤	FRAC M5	2,000倍・150L	2	4	2	前日まで		前回（FRAC 7）と別系統

- Excel では「使用回数（予定・自動）」と「同じ系統の回数（自動）」に計算式が入っていて、この表のその行までにある同じ薬剤名・同じ系統コードの行を自動で数えます（名前・コードは毎回同じ書き方にします）。同じ有効成分を含む別の商品や、育苗期・種子消毒の使用は数えないので、有効成分ごとの総使用回数はラベルで確かめてください。
- 公式の防除暦は、JA や県・病害虫防除所などの発行元から入手してください。薬剤の登録内容は必ず最新のラベルで確かめてください。
- 系統コードはクロップライフジャパンの RAC（作用機構分類）の一覧などで、有効成分から調べられます。
- 記入例の薬剤名は架空のもので、系統コードとの組み合わせも説明のための例です。